

انتظارات بیماران دارای استومی از مراقبت‌های پرستاری

نویسنده‌گان :

نسرین سرابی^۱، فریبا نصیری زیبا^۲، طاهره صفرآبادی^۳

چکیده

زمینه و هدف: بیماران دارای استومی از پرستاران انتظاراتی دارند و قادرند از این انتظارات برای ارزیابی مراقبت به عمل آمده از آنها استفاده نمایند. پژوهش حاضر با هدف تعیین انتظارات بیماران دارای استومی از مراقبت‌های پرستاری انجام شد.

روش‌ها: در این پژوهش مقطعی ۳۰۰ بیمار دارای استومی گوارشی با روش نمونه‌گیری در دسترس از بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه تعدیل شده کیفیت مراقبت از دیدگاه بیمار طی سه ماه جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS V.13 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: گزینه‌های مربوط به ارائه کمک‌های لازم درباره چگونگی لمس استومی، وقت کافی برای صحبت کردن و ارائه مراقبت توأم با احترام بالاترین و ارائه اطلاعات درباره مراقبت از پوست اطراف استومی، مسافرت با استومی و تغییر در میزان کار پس از جراحی پایین‌ترین میانگین امتیاز را داشتند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که سطح انتظار از مراقبت پرستاری زیاد بود؛ بنابراین، آموزش کارکنان پرستاری در مراقبت از بیماران دارای استومی پیشنهاد می‌شود.

واژگان کلیدی: استومی، انتظار، مراقبت پرستاری

^۱ نویسنده مسئول: کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی ایران

^۲ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

^۳ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقدمه**روش‌ها**

مطالعه فوق از نوع توصیفی- مقطوعی بوده و جامعه پژوهش را کلیه بیمارانی تشکیل دادند که به هر دلیل بستره و تحت جراحی استومی قرار گرفته بودند. با انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی ۳۰ بیمار با در نظر گرفتن $0/25 = 2$ و میزان اطمینان ۹۵٪ و توان آزمون ۸۰٪، حجم نمونه با فرمول مورد استفاده در جامعه محدود ۳۰۰ نفر تعیین گردید. پژوهشگر در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی شامل: مرکز آموزشی درمانی فیروزگر(۲۴ نفر)، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص) (۳۵ نفر)، بیمارستان امام خمینی(ره) (۸۹ نفر)، ولی‌عصر(۳۰ نفر)، انتیتوکانسر(۴۰ نفر)، شریعتی (۲۷ نفر)، شهداء تجریش (۳۰ نفر) و امام حسین(ع) (۲۵ نفر) حضور یافته و از هر محل تعداد نمونه در دسترس را در صورت دارا بودن مشخصات واحدهای مورد پژوهش و نیز ابراز تمایل برای شرکت در پژوهش، در مطالعه شرکت می‌داد. پژوهشگر پس از اخذ مجوزهای لازم خود را به واحدهای مورد پژوهش معرفی نموده و هدف از تحقیق (با امضاء فرم رضایت نامه کتبی) اخذ نمود. به کلیه نمونه‌های پژوهش اطمینان داده شد که اطلاعات بدست آمده محترمانه بوده و نیازی به ذکر نام در پرسشنامه نیست. به منظور رعایت اصول اخلاقی علاوه بر موارد مذکور، به مسئولین پرستاری بیمارستان‌ها اطمینان داده شد که در صورت تمایل آنها، نتایج پژوهش در اختیارشان قرارداده خواهد شد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد به این ترتیب که پژوهشگر در روزهای مختلف هفته و در نوبتهای کاری صبح و عصر به بخش‌های جراحی و انکولوژی مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی مراجعه و بیماران واجد شرایط را در صورت تمایل آنها به شرکت در پژوهش به عنوان جامعه پژوهش انتخاب می‌کرد. بیماران طبق معیارهای زیر در پژوهش شرکت داده شدند؛ انجام جراحی استومی و بستره و بدن در بخش جراحی یا انکولوژی حداقل به مدت ۵ روز، داشتن حداقل ۱۵ سال سن و توان پاسخگویی یا کامل کردن ابزار. بیماران ناشنوا- نابینا، لال و دارای مشکلات ذهنی که بوسیله پزشک تشخیص و بوسیله افراد خانواده تأیید شده بودند از مطالعه خارج شدند. روش گرآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بود. این

عمل جراحی استومی گاه در جهت بقا و گاه به منظور بهبود کیفیت زندگی بیمار صورت می‌گیرد که در هر دو حالت بیمار با فشار روحی عظیمی مواجه می‌گردد. از بین رفتن کنترل دفع مدفوع و ادرار، از بین رفتن فرم عادی بدن، نداشتن اعتماد به نفس لازم جهت حضور در اجتماع، مشکلات خانوادگی و شغلی، هزینه‌ی گزاف وسائل مورد نیاز، مشکلات روانی ناشی از اصل بیماری و قبول استومی در ایجاد این بحران روحی مؤثرند(۱). بررسی‌های انجام شده نشان داده که بیماران دارای استومی (جراحی روده) از پرستاران انتظاراتی دارند و قادرند از این انتظارات برای ارزیابی مراقبت به عمل آمده از آنها استفاده نمایند (۲). بیمار انتظار دارد بداند آیا قادر است روش قبلی زندگی خود را ادامه دهد یا خیر به خصوص در زمینه‌ی فعالیت‌های جنسی و حاملگی، ورزش کردن، گردش و تفریح و مسافت این اطلاعات مفید خواهد بود. بیمار باید از توانایی خویش برای انجام فعالیت ورزشی، اجتماعی، اعمالی از قبیل حمام کردن، مسافرت کردن و شناکردن با وجود استومی اطمینان حاصل نماید. بیمار نیاز به اطلاعاتی درباره چگونگی تعویض کیسه استومی، مراقبت از پوست اطراف استومی، شستشوی استومی، نوع و مصرف مواد غذایی، محدودیت‌های غذایی و محدودیت‌های فعالیتی دارد(۳). به طور کلی انتظارات بیماران دارای استومی از مراقبت پرستاری در ۳ بعد حمایت استومی، اطلاعات داده شده و حمایت روحی- روانی طبقه‌بندی می‌شوند(۴). در صورتی که پرستار و طراحان مراقبت‌های مربوط به سلامتی درباره انتظارات و ترجیحات بیمار اطلاع داشته باشند، مراقبت می‌تواند موثرتر، ارزان‌تر و نزدیک‌تر به آنچه مطابق خواست بیماراست ارائه شود (۵). با توجه به نیازهای خاص این گروه از بیماران و با عنایت به اینکه بیشتر تحقیقات پرستاری بر برآیند مراقبت بدون توجه به خواستهای بیمار تمرکز دارند و به صورت کلی انجام می‌شوند محقق بر آن شد که با انجام این پژوهش گامی در جهت روش‌شن شدن انتظارات این گروه از بیماران از پرستاران برداشته شود تا هم خواسته‌های بیماران برآورده گردد و هم در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری اقداماتی انجام گیرد.

نفر که خصوصیات واحدهای مورد پژوهش را دارا بودند تعیین گردید.

یافته‌ها

توزیع فراوانی برخی مشخصات بیماران دارای استومی در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. یافته‌های جمعیت شناختی نشان داد که محدوده‌ی سنی بیماران ۸۷-۳۰ با میانگین ۶۴/۵۳ سال و انحراف معیار ۱۳/۲۵ بود. ۲۸/۳ درصد افراد در محدوده‌ی سنی ۵۹-۵۰ سال قرار داشتند. بیشتر بیماران شرکت کننده در این مطالعه مرد بودند (۵۲٪). ۱۴۱ نفر (۷٪) متأهل، ۳۷ نفر (۱۲/۳٪) مطلقه و سایر موارد، ۹۲ نفر (۳۰/۷٪) را تشکیل دادند. ۱۳۸ نفر (۴۶٪) بی‌سجاد، ۱۰۷ نفر (۳۵/۷٪) زیر دیپلم و ۵۵ نفر (۱۸/۳٪) دیپلم و بالاتر بودند. ۲۲۲ نفر (۷۴٪) دارای کولستومی، در ۶۲ درصد علت انجام استومی به علت بدحیمی بوده و ۳۶ درصد به صورت همزمان شیمی درمانی هم دریافت می‌کردند. پژوهش نشان داد که با توجه به طبقه‌بندی میانگین انتظار از هریک از گویه‌های مراقبت پرستاری مربوط به پرسشنامه که از خیلی کم (۱) تا خیلی زیاد (۴) در نظر گرفته شده بود، مشخص شد که گویه‌های مربوط به «چقدر انتظار دارید پرستار کمک‌های لازم درباره چگونگی لمس استومی را به شما بدهد؟»، «چقدر انتظار دارید پرستار به شما وقت کافی برای صحبت کردن بدهد؟» و «چقدر انتظار دارید پرستار مراقبت را همراه با احترام به شما ارائه بدهد؟» به ترتیب با ۳/۲۶، ۳/۲۵ و ۳/۰۷ بالاترین میانگین انتظار و گویه‌های مربوط به «چقدر انتظار دارید پرستار درباره مراقبت از پوست اطراف استومی به شما اطلاعات بدهد؟»، «چقدرات انتظار دارید پرستار مسافت را استومی به شما اطلاعات بدهد؟» و «چقدر انتظار دارید پرستار در مورد تغییر در میزان کار و فعالیت پس از جراحی به شما اطلاعات بدهد؟» به ترتیب با ۲/۴۱، ۲/۱۹ و ۲/۱۱ به ترتیب پایین‌ترین میانگین انتظار از مراقبت‌های پرستاری مربوط به استومی را به خود اختصاص دادند (جدول شماره ۲).

پرسشنامه در دو بخش تنظیم گردید، بخش اول شامل سؤالاتی درباره مشخصات فردی نظریه سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، نوع استومی، نوع بیماری زمینه‌ای و نوع درمان پس از جراحی بود که توسط پژوهشگر برای نمونه‌های مورد پژوهش تهیه شده بود. بخش دوم پرسشنامه سؤالاتی به منظور بررسی انتظارات آنها از مراقبت‌های پرستاری بود. پرسشنامه‌ی کیفیت مراقبت از دیدگاه بیمار (QPP¹) بوسیله پرسون² و همکاران در سال ۲۰۰۵ تدوین گردید^(۶) که در این پژوهش تعدیل شد. در مرحله اول با مراجعه به منابع علمی موجود ابزار تهیه گردید سپس به صورتی ساده و روان به فارسی برگردانده شد و با استفاده از نظرات اساتید راهنمای، مشاور و مشاور آمار پرسشنامه تعديل شده اولیه با افزودن گویه‌هایی به گویه‌های پرسشنامه‌ی اولیه تنظیم گردید سپس جهت نظر سنجی در اختیار ۱۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار داده شد و پس از جمع آوری و اعمال نظرات ابزار تهیه شده در کمیته‌ی امور پژوهشی دانشکده مطرح و مورد بررسی نهایی قرار گرفت. در خاتمه اجازه‌ی استفاده از ابزار توسط شورای تحصیلات تكمیلی دانشکده اعلام گردید. پرسشنامه دارای ۲۰ گویه بود که در آن گویه‌های مراقبت پرستاری مربوط به استومی در بعد انتظار سنجیده می‌شد. سوالات با مقیاس چند گزینه‌ای لیکرت مورد بررسی قرار گرفتند و به صورت: خیلی کم (نمره ۱)، کم (نمره ۲)، زیاد (نمره ۳) و خیلی زیاد (نمره ۴) طبقه‌بندی شدند. حداقل و حداکثر امتیاز مربوط به هر پرسشنامه بین ۲۰ و ۸۰ بود. پس از گردآوری، اطلاعات با استفاده از برنامه‌ی نرم افزار کامپیوتري SPSS ویرایش ۱۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای توصیف داده‌ها از جدول توزیع فراوانی و در ارتباط با «تعیین درجه انتظارات بیماران دارای استومی از مراقبت‌های پرستاری مربوط به استومی»، میانگین امتیاز هر گویه در یکی از ۴ طبقه‌بندی زیر قرار می‌گرفت: ۱- ۱/۷۵ (خیلی کم)، ۲- ۲/۵ (کم)، ۳- ۳/۲۵ (زیاد)، ۴- ۴/۷۵ (خیلی زیاد). روایی ابزار با استفاده از اعتبار محظوظ و پایابی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (α=۰/۷۶) بر روی سی

¹. Quality from Patient Perception

². Persson

جدول ۱- توزیع فراوانی داده‌های مربوط به برخی مشخصات بیماران دارای استومی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران، سال(۱۳۸۷)

درصد		تعداد		داده‌های دموگرافیک	
				نوع استومی	
۷۴		۲۲۲		کولستومی	
۲۶		۷۸		ایلئوستومی	
۶۲		۱۸۶		بدخیمی	
۳۸		۱۱۴		خوش خیمی	
۳۶		۱۰۸		شیمی درمانی	
۱		۳		رادیوتراپی	
/۷		۱۰۷		نوع درمان پس از استومی	
-		شیمی درمانی			
۳۵		رادیوتراپی			
/۳		۸۲		هیچ کدام	
۲۷					

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی پاسخ واحدهای مورد پژوهش به انتظار از مراقبت‌های پرستاری مربوط به استومی، سال(۱۳۸۷)

شماره	گویه‌های مربوط به انتظار	میانگین امتیازات	جمع	خیلی زیاد	زیاد	کم	خیلی کم	تعداد
۱	چقدر انتظار دارید پرستار کمک های لازم درباره چگونگی لمس استومی را به شما بدهد؟	۳/۲۶	۳۰۰	۳۸	۶۱	۱۳۱	۷۰	درصد
۲	چقدر انتظار دارید پرستار به شما وقت کافی برای صحبت کردن بدهد؟	۳/۲۵	۳۰۰	۱۵۱	۹۶	۳۱	۲۲	تعداد
۳	چقدر انتظار دارید پرستار مراقبت را همراه با احترام به شماراشه بدهد؟	۳/۰۷	۳۰۰	۱۳۳	۷۳	۷۸	۱۶	تعداد
۴	چقدر انتظار دارید پرستار درباره مراقبت از پوست اطراف استومی به شما اطلاعات بدهد؟	۲/۴۱	۳۰۰	۴۲	۱۰۵	۸۸	۶۵	تعداد
۵	چقدر انتظار دارید پرستار درباره مسافت با استومی به شما اطلاعات بدهد؟	۲/۱۹	۳۰۰	۳۸	۴۳	۱۵۹	۶۰	تعداد
۶	چقدر انتظار دارید پرستار در مورد تغییر در میزان کار و فعالیت پس از جراحی به شما اطلاعات بدهد؟	۲/۱۱	۳۰۰	۱۰۰	۱۲/۷	۱۴/۳	۵۳	درصد

بحث

شما اطلاعات بددهد؟»، کادول^۲ (۱۹۹۵) نشان داد که درصد بیماران دارای ایلئوستومی و کولستومی خواهان دریافت اطلاعات درباره مراقبت از استومی بویژه مراقبت از پوست اطراف استومی هستند. از دلایل تفاوت نتیجه فوق با مطالعه حاضر اینکه، مطالعه کادول ۲ ماه بعد از جراحی استومی انجام گرفته بود و دوم اینکه ۴۳ درصد آنها در زمان بررسی دچار عوارض پوستی ناشی از مراقبت غیر صحیح از آن گردیده بودند(۱۰)، در صورتی که در مطالعه‌ی حاضر عدم آگاهی از وجود این عوارض به همراه عدم بروز آنها در مدت بستری بودن بیمار، از مهم‌ترین دلایل پایین بودن سطح انتظار بیماران در این بعد از مراقبت می‌باشد. در توجیه گویه‌ی «چقدر انتظار دارید پرستار درباره مسافرت با استومی به شما اطلاع از بددهد؟»، می‌توان اینگونه استنباط کرد که عدم اطلاع از نبود احتمالی وسایل و تجهیزات مورد نیاز و پرستار متخصص در محل سکونت، عدم اطلاع از تاثیر غذا و آب محل مورد نظر برعملکرد استومی و نداشتن آگاهی درمورد لزوم در نظر گرفتن شرایط و نحوه نگهداری وسایل و تجهیزات در موقع مسافرت از دلایل پایین بودن سطح انتظارات این گروه است(۹). نتایج با مطالعه‌ی تسنگ^۳ و همکاران (۲۰۰۴) مطابقت دارد. آنها نشان دادند بیمارانی که پس از جراحی به راحتی خسته شده و از نظر جسمی دچار فرسودگی می‌شوند، تمایلی به بحث در این باره ندارند (۱۱). گویه‌ی مربوط به «چقدر انتظار دارید پرستار در مورد تغییر در میزان کار و فعالیت پس از جراحی به شما اطلاعات بددهد؟»، پایین‌ترین میانگین انتظار را نشان داد. به نظر می‌رسد علی از جمله تجربه شخصی از بیماری و نوع سازگاری با درمان‌های کمکی در افراد مختلف، کم‌خونی و خستگی همراه با شیمی درمانی تهاجمی، پرتو درمانی و خود جراحی روده، (چرا که جراحی در ابتدا بسیار دردناک بوده و فعالیت بیمار را تاحد قابل توجهی محدود می‌کند)، میانگین سنی بالای افراد و نبودن آنها در مرحله فعل زندگی، وجود مشکلات جسمی متعدد در افراد مسن از جمله مشکلات قلبی-عروقی، مفصلی، استخوانی و... باعث پایین بودن انتظارات

نتایج مطالعه نشان داد که گویه‌ی «چقدر انتظار دارید پرستار کمک‌های لازم درباره چگونگی لمس استومی را به شما بددهد؟» بالاترین میانگین انتظار را نشان داد. دوره‌ی بعد از جراحی یک دوره‌ی مناسب برای بحث دو نفره پرستار- بیمار می‌باشد. در این دوره بیمار به این واقعیت می‌رسد که مراقبت از استومی نیازمند نگاه کردن، دست زدن، بررسی روزانه استومی و مراقبت دقیق از پوست اطراف آن می‌باشد (۷). سیمونز^۱ و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیق خود نشان دادند که کمک پرستار این روند پذیرش را برای بیمار تسهیل می‌کند. آنها نشان دادند بیمارانی که استومی خود را قبول دارند کنترل بیشتری روی مراقبت از خود داشتند، روابط اجتماعی بهتری دارند و خواهان دریافت حمایت از اطرافیان خود هستند (۸). انتظار بالای بیماران، این واقعیت را منعکس می‌کند که بیمار در پذیرش استومی به حمایت و هم‌دلی نیاز دارد. در ارتباط با گویه‌ی «چقدر انتظار دارید پرستار به شما وقت کافی برای صحبت کردن بددهد؟»، پرسون و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعه‌ی خود نشان دادند که بیماران غالب پرستاری را پیدا نمی‌کنند که با او درباره نگرانی‌ها و ترسهای‌شان صحبت نمایند. وی دلایل این نقص را کمبود پرسنل و توجه بیشتر به مشکلات فیزیکی و راحتی بیمار نسبت به موارد عاطفی و گاه نیز نادیده گرفتن موارد روانی مرتبط با مشکل اصلی عنوان نمودند(۶). در توجیه گویه‌ی مربوط به «چقدر انتظار دارید پرستار مراقبت را همراه بالاحترام به شما ارائه بددهد؟»، برخی منابع معتقدند که دوران بیماری و بستری شدن در بیمارستان برای بیمار و خانواده‌ی وی تنشزرا و نگران کننده می‌باشد. حضور پرستار به بیمار کمک می‌کند تا این دوره را طی کنند و در این راستا برقراری یک ارتباط خوب، روش و حمایت کننده مهم‌ترین قسمت کمک رسانی پرستار به شمار می‌آید (۹). نتایج می‌تواند منعکس کننده توجه بیشتر پرستاران به این رفتار مراقبتی در مراقبت از بیماران دارای استومی باشد. در ارتباط با گویه‌ی «چقدر انتظار دارید پرستار درباره مراقبت از پوست اطراف استومی به

^۲. Caldwell

^۱.Simmons

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که سطح انتظار از مراقبت پرستاری زیاد بوده و برخی گوییدهای دارای میانگین سطح انتظار بالایی بودند که روی نمره کلی انتظار تأثیر گذار بوده است، توجه به این گوییدهای تلاش در جهت برآورده ساختن انتظارات بیمار، باعث بهبود کیفیت مراقبت خواهد شد. از آنجا که گوییدهای مختص بیماران استومی بود و در بیشتر ابعاد نگرانی بیماران مشهود بود می‌توان عنوان کرد که پرستاران کلیدی‌ترین افراد تیم در مراقبت از بیماران استومی به شمار می‌روند، لذا با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می‌شود که مراقبت‌های ارائه شده توسط پرستار در بیماران دارای کولاستومی و ایلنوتومی مطابق با نیازهای خاص این گروه باشد. از آنجایی که اکثر بیماران دارای وضعیت‌های مزمن در منزل مراقبت می‌شوند، بنابراین مراقبت و آموزش در زمان بستری باید بر اساس نیازهای آموزشی بیمار جهت چگونگی مراقبت از خود در منزل باشد. بنابراین آموزش پرستاران در امر مراقبت از بیماران دارای استومی توصیه می‌شود.

تقدیر و تشکر

پژوهشگران به این وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی و بیماران شرکت کننده در پژوهش ابراز می‌نمایند.

در این مطالعه باشد. یافته‌های مربوط به توزیع فراوانی درجه انتظار واحدهای مورد پژوهش از مراقبت‌های پرستاری مربوط به استومی نشان داد که دامنه امتیازات در محدوده کم تا زیاد بود. نتایج مطالعه با پژوهش انجام شده توسط پک^۱ و همکاران (۲۰۰۴) که در یونان انجام شد هماهنگ است. با توجه به تحقیقات انجام شده در یونان، بیماران با یک سطح انتظارات کم تا زیاد از مراقبت پرستاری وارد سیستم مراقبتی می‌شوند. آنها دلایل این این امر را این‌گونه توجیه کردند که سطح اطلاعات فراهم شده بوسیله وسائل ارتباط جمعی در ارتباط با معرفی پرستار و خدمات ارائه شده توسط وی پایین بوده و از طرفی نگرش اجتماعی ناخوشایند نسبت به پرستار در جامعه را در این مورد تأثیر گذار دانستند. به عقیده‌ی آنها پژوهش تنها منبع موثق در کل مراحل مراقبت است و پرستار تنها دستورات پژوهش را اجرا می‌کند. به نظر می‌رسد این نتیجه با جامعه کنونی ما سازگار باشد. از طرفی مطالعات نشان می‌دهند که افراد مسن از پرستار سؤالات کمتری می‌کنند و یک ارتباط منفعل دارند و از طرفی مشکلات ارتباطی مرتبط با بی‌سوادی و وضعیت سلامتی پایین نیز باعث کاهش سطح انتظارات شان از پرستاران خواهد شد (۱۳). با توجه به اینکه در این مطالعه میانگین سنی افراد ۶۴/۵۳ سال بود، تاحدودی این سطح انتظارات قابل توجیه است. هرچند که نتایج این مطالعه به نوبه خود ارزشمند است اما به دلیل محدودیت‌هایی مثل عدم نمونه گیری احتمالی، احتمال تأثیر سرایط جسمی و روانی بیماران دارای استومی بعد از عمل جراحی برای پاسخگویی به سؤالات و مورد بررسی قرار گرفتن تمام بیماران جدای از میزان تحصیلات که ممکن است در مواردی درک یکسانی از سؤالات حاصل نشده باشد، در مورد تعیین پذیری نتایج چندان نمی‌توان اظهار نظر کرد و برلزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید می‌گردد.

¹. Peck

References:

1. Lumby J. England K. Ptient satisfaction with nursing care in a colorectal surgical population. International Journal of Nursing Practice. 2000; 16: 140-145.
2. Staniszewska S, Ahmed L. Expectation and Satisfaction with Health Care. International Journal of Nursing Standards. 1998; 12: 34-38.
3. Schrock T.R. Complications of continent ileostomy. The American Journal of Surgery. 2001; 13(8): 162-169.
4. Gelernt I M, Bauer J.J & Kreel I. Ostomy patient education. American Society of colon and rectal surgeons. 2005; 2: 1-4.
5. Wood SN. Study of patient satisfaction with chemotherapy nursing care. European Journal of Oncology Nursing. 1998; 2(3): 143-153.
6. Persson E. Gustavsson B. Hellstrom A.L. Lappas G. Hulten L. Ostomy Patient Perception of Quality of Care. Journal of Advanced Nursing. 2005; 41(1): 51-58.
7. Mahjubi B, Derakhshani S. Ostomy care (1381).Tehran: Eshtiagh Publisher: 60.[persian]
8. Simmons KL, Smith JK, Bobb KN, Liles LLM. Adjustment to colostomy. Journal of Avanced Nursing. 2007; 60(6): 627-635.
9. Wittenauer J. Caring for the Ostomy Patient. National Center of Continuing Education, 2007; 20: 70-77.
10. Caldwell K. Heterosexuality: A neglected issue in stoma care. BJN. 1995; 4(17): 1009–1012.
11. Tseng H-C, Wang H-H, Hsu Y-Y, Weng W-CH. Factors Related to Stress in Outpatients with Permanent Colostomies. Kaohsiung J Med Sci. 2004; 20: 70-77.
12. Karadag A, Mentes BB, Uner A. Impact of stomatherapy on quality of life in patients with permanent colostomies or ileostomies. Int J Colorectal Dis. 2003; 18:234-238.
13. Peck BM and Peck BM, Ubel PA, Roter DL, Goold SD, Asch DA, Jefferys AB, Grambow SC, Tulsky JA. Do Unmeet Expectations for Specific Tests, Refferrals and New Medications Reduce Patient Satisfaction? J Gen Intern Med. 2004; 19(1): 1080- 1087.