

علل صدمات در نوجوانان (۱۵-۱۹ سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان

نویسنده‌گان:

رقیه حاتمی^۱، نسرین جعفری^۲، پوران اخوان اکبری^۳، رافت کاظم زاده^۴، پریسا حاجی آقا محمدی^۵، عدیله عالی^۶، شهلا پورقهرمان^۷، مهرناز مشعوفی^۸

۱. مری پرستاری مامایی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

۲. کارشناس ارشد پرستاری- مری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

۳. کارشناس ارشد مامایی- مری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

۸. عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

چکیده

زمینه و هدف: حادثه پیش آمد نامطلوب و غیرمنتظره ای است که اغلب در هر سنی ممکن است رخ دهد لیکن در گروه سنی جوانان بیشترین تعداد مرگ و میر را موجب می گردد. سوانح ناشی از وسایط نقلیه موتوری در حدود نصف مجموع حوادث و سوانح را تشکیل می دهد. این مطالعه با هدف بررسی علل صدمات در نوجوانان (۱۵-۱۹ سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت.

روش کار: این مطالعه از نوع گذشته نگر بوده و تمامی پرونده‌های مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان در گروه سنی ۱۵-۱۹ سال که به علت تصادفات رانندگی (حوادث رانندگی) در سال ۱۳۸۵ مراجعه نموده بودند استخراج و سپس اطلاعات مربوط به علل خارجی حوادث و نوع صدمه آنها جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آمار استنباطی میانگین و فراوانی داده‌ها انجام گرفته است.

یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که از کل ۳۷۸ نفر (در سنتین ۱۹-۱۵ سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس اکثریت (۸۱٪) افراد ذکر بوده و فقط ۱۹ افراد را افراد مونث تشکیل می دادند. از این تعداد ۴۷ درصد ساکن مرکز استان، ۹ درصد ساکن شهرستانهای دیگر و ۴۴ درصد ساکن روستاهای استان بوده اند. همچنین ۷۴ درصد مراجعات به علت حوادث موتوری بوده که نزدیک به نیمی از این موارد (۴۹٪) مربوط به موتور سیکلت بوده است. صدمات ناشی از آن حوادث به ترتیب مولتیپل ترومما (۲۵٪)، ضربه به سر (۲۲٪)، شکستگی اندام تحتانی (۱۸٪)، شکستگی اندامهای فوقانی (۸٪)، شکستگی ستون فقرات (۱٪)، قطع عضو (۱٪) و زخم (زخم باز و سطحی) (۲۵٪) می باشد.

نتیجه گیری: یافته‌ها نشان می دهد حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری سهم قابل ملاحظه ای از کل سوانح و حوادث را تشکیل می دهد. لازم است که توجه و تأکید بر برنامه‌های پیشگیری از ترومما در مورد مردان جوان و وسیله نقلیه موتور سیکلت متوجه شود.

واژه‌های کلیدی: صدمات، نوجوانان، اورژانس

نظر درسال ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت که از کل مراجعین به بخش اورژانس ۳۷۸ نفر بدليل سوانح به این بخش مراجعه داشتند. سپس اطلاعات مربوط به کل واحدها از نظر سن، جنس، محل سکونت علل صدمات و حوادث و نوع صدمه اشاره شده (نظیر سوختگی، خفگی، خودکشی، سقوط از بلندی، ضرب و جرح و غیره)، از روی پرونده افراد استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی بصورت جدول فراوانی و میانگین داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

یافته‌ها

نتایج حاصل نشان داد که از کل ۳۷۸ نفر در سینین (۱۹-۱۵ سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس، اکثریت (۸۱٪) افراد مذکوربوده (نمودار شماره ۱) و فقط ۱۹ درصد را افراد مونث تشکیل می‌داده‌اند. از این تعداد ۴۷ درصد ساکن مرکز استان، ۹ درصد ساکن شهرستانهای دیگر و ۴۴ درصد ساکن روستاهای استان بودند (نمودار شماره ۱). همچنین ۷۴ درصد (۳۷۸ نفر) به علت حوادث و فقط ۲۶ درصد به علت بیماری به بخش اورژانس مراجعه نموده بودند. علل اکثریت حوادث مربوط به وسائل نقلیه موتوری بوده که نزدیک به نیمی از این موارد (۴۹٪) مربوط به موتورسیکلت بوده است (نمودار شماره ۲). صدمات ناشی از این حوادث به ترتیب مولتیپل ترومما (۲۵٪)، ضربه به سر (۲۲٪)، شکستگی اندام تحتانی (۱۸٪)، شکستگی اندامهای فوقانی (۷٪)، شکستگی ستون فقرات (۱٪)، قطع عضو (۱٪) و زخم و جراحت (۲۵٪) بود (نمودار شماره ۳).

مقدمه


hadثه، پیش‌آمد نامطلوب و غیرمنتظره ای است که اغلب اوقات باعث ایجاد ضرب و جرح و یا مرگ و میر انسانی می‌گردد (۱). جراحات واردہ ممکن است شخص را برای همیشه از فعالیت و کار محروم سازد (۲). سوانح وحوادث در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد لیکن در گروه سنی جوانان بیشترین تعداد مرگ و میر را موجب می‌گردد (۳). میزان وقوع حوادث نزد مردان احتمالاً برای اینکه بیشتر در معرض خطرات قرار دارند بیش از زنان است (۴). سوانح ناشی از وسایط نقلیه موتوری در حدود نصف مجموع حوادث و سوانح را تشکیل می‌دهند (۵). طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، سالانه حدود ۷۸ میلیون نفر در جهان دچار حادثه می‌شوند که نیازمند خدمات بهداشتی درمانی هستند و اولین قدم درجهت پیشگیری از حوادث افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطراتی است که در کمین آنهاست (۶). آگاهی از علل صدمات و حوادث جهت طرح اقدامات مناسب جهت پیشگیری از حوادث از نیازهای ضروری است (۷). لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی علل صدمات در نوجوانان (۱۵-۱۹ سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان درسال ۱۳۸۵ انجام گرفت.

روش کار


روش مطالعه گذشته نگر بود و روش نمونه گیری مبتنی بر هدف می‌باشد برای این منظور ابتدا پرونده‌های تمام مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان در گروه سنی مورد

نفر مرد بودند و بیشترین فراوانی مربوط به خدمات نیز مربوط به ترومما (۳۵٪) بوده است که با مطالعه ما همخوانی دارد(۹). در مطالعه حاضر تصادفات موتور سیکلت در گروه سنی ۱۵-۱۹ سال بیشترین میزان را داشته و اکثریت رانندگان موتور از کلاه ایمنی در هنگام سانحه استفاده نمی کردند. ضربه به سر در میان مصدومین مورد مطالعه ما (بعد از مولتیپل ترومما و زخم جراحت باز) درصد بالایی رابه خود اختصاص داده است که بیشتر در افرادی که از کلاه ایمنی استفاده نکرده بودند اتفاق افتاده است. یافته فوق ضرورت استفاده از کلاه ایمنی را برای کاهش میزان صدمه به سر در جوانان استفاده کننده از موتورسیکلت، بیشتر روشن می سازد. در پژوهش دیگری که توسط صادقیان و همکاران در سال ۱۳۸۷ انجام شد، یافته ها نشان می دهد که گروه سنی ۲۰-۲۹ و ۱۳-۱۹ سال به ترتیب دارای بیشترین مصدومیت (۳۰/۳٪) و (۱۹/۶٪) هستند. در داخل شهر، موتور سواران با ۵۳/۷ درصد و در خارج شهر، مسافرین و رانندگان خودرو با ۶۴ درصد بیشترین فراوانی مصدومین را تشکیل می دادند(۱۰). در مطالعه دکتر شهلا و همکاران افزایش آمار تصادفات موتورسیکلت مورد مطالعه قرار گرفته بطوریکه افزایش ۱۶/۶ درصد تصادفات با موتور سیکلت در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ به دلیل افزایش رغبت جوانان به این وسیله عنوان شده است؛ به طوریکه در گروه سنی ۱۵-۲۴ سال میزان تصادفات از ۱۶۲ مورد در سال ۱۳۸۲ به


نمودارشماره ۱ توزیع فراوانی درصد نمونه های مورد پژوهش بر حسب جنس و محل سکونت



نمودارشماره ۲ فراوانی نمونه های مورد پژوهش بر حسب نوع وسیله نقلیه



نمودارشماره ۳ فراوانی صدمات در نمونه های مورد پژوهش



بحث

تروماهای رانندگی خصوصاً موتور سیکلت، شایع ترین عامل ایجاد ترومما بوده که نزدیک به نیمی از این موارد را تشکیل می دهد. در مطالعه خاتمی و همکاران که در سال ۱۳۸۲ انجام شد نشان داده شد که در اکثر تصادفات رانندگی، موتور سواران، سرنشینان اتومبیل و عابران پیاده به ترتیب با ۴۲/۱ درصد، ۲۸/۱ درصد و ۲۵/۶ درصد بخش اعظم قربانیان ترومما را به خود اختصاص دادند(۸). در پژوهش سلیمانی و همکاران در سال ۱۳۸۷ نیز نشان داده شده است که از میان ۱۱۴۱ بیمار مورد مطالعه ۹۵۲

موتورسیکلت بوده است. به این ترتیب حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری، سهم قابل ملاحظه ای از کل سوانح و حوادث را تشکیل می دهد. دسترسی سهل و آسان قشر جوان به موتورسیکلت و استفاده بی قید و شرط از این وسیله و همچنین عدم رعایت موارد ایمنی از جمله عدم استفاده از کلاه ایمنی سبب ایجاد حوادث متعدد گردیده است. توجه و تأکید ویژه به اجرای برنامه های پیش گیری از ترومما در مورد مردان جوان و استفاده کنندگان از موتورسیکلت ضروری بنظر می رسد. در ضمن رعایت اصول صحیح جاده سازی و تدوین استراتژیهای جهت کاهش شدت سرعت و اجباری نمودن استفاده از کلاه ایمنی در موتور سواران و بهبود فرآیند امداد رسانی به مصدومین جاده ها، برای کاهش حوادث جاده ای و کاهش عوارض ناشی از تصادفات، به ویژه در استفاده کنندگان از موتور سیکلت که نیروهای جوان و فعال و تاثیر گذار بر سلامت و اقتصاد جامعه می باشند، ضروری به نظر می رسد.

۲۲۹ مورد در سال ۱۳۸۳ رسیده است (۴۱٪ افزایش) که تا حدودی با مطالعه حاضر مطابقت دارد(۱۱). همچنین در اغلب مطالعات بیشترین ترومای موتورسواران را شکستگی های اندام تحتانی و به میزان ۵۲-۴۰ درصد تشکیل می دهد که در مطالعه حاضر شکستگی اندام تحتانی ۱۸ درصد و اندام فوقانی ۸ درصد بوده است. آسیب پذیری بسیار بالای موتورسواران نسبت به سایر استفاده کنندگان از وسایل نقلیه موتوری در جاده ها، در مطالعات متعددی نشان داده شده است. این گروه افراد به دنبال کوچکترین برخورد، دچار صدمه می شوند. این مهم در مطالعه خلجی و همکاران که در یکی از بیمارستانهای کاشان انجام شد و نشان داد که ۵۶ درصد بستری شدگان حوادث ترافیکی، موتورسواران بودند(۱۲)، با یافته های مطالعه ما همخوانی دارد.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد از نظر جنسیت، اکثریت موارد مذکور بوده اند. همچنین اکثریت حوادث مربوط به وسایل نقلیه موتوری به ویژه

- ۱- ایلدر آبادی، اسحاق. درسنامه پرستاری بهداشت جامعه ۱۹۲۳. تهران. انتشارات جامعه نگر. ۱۳۸۳. ص: ۴۴۸
- ۲- Dunning KK, Davis KG, Kotowski SE, Elliott T, Jewell G, Lockey J. Can a transitional work grant program in a workers' compensation system reduce cost and facilitate return to work. *Journal of occupational and environment hygiene*. 2008 Sep;5(9):547–55.
- ۳- Kramer AF, Cassavaugh N, Horrey WJ, Becic E, Mayhugh JL. Influence of age and proximity warning devices on collision avoidance in simulated driving. *Hum Factors*. 2007 Oct;49(5):935–49
- ۴- فلاخ زاده ، حسین. اپیدمیولوژی توصیفی تصادفات دراستان یزد. مجله علمی پزشکی قانونی پاییز ۱۳۸۵؛ ۱۲: ۱۵۸-۱۶۱؛ ۳ مسلسل ۴۳، ص:
- ۵- خسروانی، مسعود. صادقی پور، حمیدرضا. خطرات تهدیدکننده سلامت درجهان و ایران و راهبردهای آن نسخه الکترونیکی کتاب جامع بهداشت عمومی. ویرایش دوم، دکتر حسین خاتمی و همکاران. انتشارات ارجمند تهران ۱۳۸۵، ص: ۱۴۱۳
- ۶- Morrison, DS; Petticrew, M; Thomson, H. What are the most effective ways of improving population health? *Journal of Epidemiology & Community Health*: Volume 57(5)May 2003: 327–333.
- ۷- یعقوبی، حمید. بررسی نقش عوامل انسانی دربروز تصادفات رانندگی درایران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، اندیشه و رفتار ۶ (پیاپی ۲۱) تابستان ۱۳۷۹، ص: ۶۷-۶۰
- ۸- خاتمی سید مسعود، کلانتر معتمدی سید محمدحسین، محبی حسن علی، طریقی پیام، فرزانگان غلامرضا، رضایی یدالله، بخشندۀ هومن، شکیبا مجید، اپیدمیولوژی ترومما در بیمارستان بقیه الله (عج)
- ۹- سلیمی جواد، زارعی محمدرضا، بررسی اپیدمیولوژیک ترومای مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز ۱۳۸۷، ص: ۱۱۵-۱۲۰
- ۱۰- صادقیان فریده، خسروی احمد، امامیان محمد حسین، یونسیسیان ربایه. الگوی آسیب‌های حوادث ترافیکی و عوامل مرتبط در شاهروود، پاییش تابستان ۱۳۸۷، ص: ۲۳۳-۲۲۵
- ۱۱- شهلا احمد، چاره ساز سعید، بررسی آسیب‌های ناشی از تصادفات موتورسیکلت در مدت دو سال در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مجله علمی پزشکی قانونی دوره ۱۲ شماره ۲، تابستان ۱۳۸۵
- ۱۲- خلجی کاظم، مجذ زاده سید رضا، اشراقیان محمد رضا، متولیان عباس، هلاکویی نایینی کورش، عوامل خطر وقوع صدمات ناشی از تصادفهای ترافیکی در رانندگان جاده قزوین- لوشان. ۱۳۸۴. ص: ۳۵-۲۷