

رشد جسمی مبتلایان به تالاسمی بر اساس معیار منحنی رشد استاندارد

نویسنده‌گان :

راحله محمدی^۱، ایراندخت الهیاری^۲، عفت مظاہری^۳، مهری سید جوادی^۴، گیتی آریش^۵

چکیده

زمینه و هدف: بتأ تالاسمی مژوز از جمله بیماریهایی است که در آن رشد طبیعی افراد به علت عوارض ناشی از بیماری مختل می‌شود. علیرغم پیشرفت‌هایی که در درمان این بیماران صورت گرفته، اختلال رشد در درصد قابل توجهی از آنها مشاهده می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین معیارهای رشد بیماران تالاسمی مژوز و مقایسه آن با معیار منحنی رشد استاندارد انجام شد.

روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی ۳۷ بیمار مبتلا به بتأ تالاسمی مژوز به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل یک پرسشنامه اطلاعات فردی، متر و ترازو بود. اطلاعات بدست آمده از پرسش نامه توسط برنامه نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: از ۳۷ بیمار مورد بررسی ۱۹ نفر پسر و ۱۸ نفر دختر بودند که میانگین سن آنها $۱۵/۴۳ \pm ۵/۹۷$ سالبوده‌و $۵۴/۰۵$ درصد(۱۵ نفر) زیر ۱۵ سال سن داشتند. میانگین قدی مبتلایان $۱۴۲/۴۳ \pm ۱۸/۰۳$ سانتی‌متر و میانگین وزنی آنها $۳۸/۴۱ \pm ۱۲/۳۲$ کیلوگرم بود. $۶۴/۹$ درصد (۲۴ نفر) بیماران قد زیر صدک ۵ درصد و ۵۴ درصد (۲۰ نفر) آنان وزن زیر صدک ۵ درصد داشتندو در کل وزن و قد بیماران زیر منحنی رشد استاندارد بود و با افزایش سن این اختلاف بیشتر می‌شد.

نتیجه گیری: اختلال رشد بیماران مبتلا به بتأ تالاسمی مژوز از دهه اول زندگی شروع می‌شود و با افزایش سن شدت می‌یابد. جهت جلوگیری از اختلال رشد لازم است مبتلایان به طور مرتب از نظر سرعت رشد بررسی شده و عوامل دخیل در اختلال رشد به موقع شناسایی و اقدامات پیشگیری کننده مناسب صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: بتأ تالاسمی مژوز، رشد جسمی، منحنی رشد

Email: r.mohammadi@arums.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

Email: i.allahyari@arums.ac.ir

^۲ کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشکده پرستاری مامایی اردبیل

Email: e.mazaheri@arums.ac.ir

^۳ عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل

Email: m.seyedjavadi@arums.ac.ir

^۴ عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل

^۵ کارشناس پرستاری بیمارستان بوعلی

رشد و نمو کودکان مبتلا به تالاسمی مازور در شهر اردبیل انجام شد.

روش ها

در مطالعه توصیفی- مقطعی فوق ۳۷ بیمار مبتلا به بتا تالاسمی مازور به روش سرشماری و با کسب رضایت به صورت شفاهی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشخصات فردی با ۲۱ سوال و متر و ترازو برای اندازه گیری قد و وزن بود. پرسشنامه توسط خود پژوهشگران تدوین شده و اعتبار آن بوسیله اعتبار محتوا و پایابی آن به روش آلفا کرونباخ(۰/۸۴درصد) سنجیده شد. از ترازوی رسا ساخت کشور ایران با دقت اندازه گیری ۵/۰ کیلوگرم برای اندازه گیری وزن و قد (ترازو حاوی متر نیز می باشد) استفاده شد. اندازه گیری قد بر حسب سانتی متر به صورت ایستاده انجام شد. وزن با حداقل پوشش که تقریبا در تمام بیماران یکسان بود، با کمک ترازوی ثابت بر حسب کیلو گرم محاسبه شد. داده ها طی سه ماه در مرکز تالاسمی بیمارستان بوعلی جمع آوری شد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه توسط برنامه نرم افزاری SPSS و با روش های آماری توصیفی و تحلیلی مانند تی زوج مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

از میان ۳۷ بیمار مورد مطالعه ۱۹ نفر(۵۱/۴درصد) پسر و ۱۸ نفر(۴۸/۶درصد) دختر بودند. محدوده سنی مبتلایان بین ۱-۲۷ سال با میانگین سنی $14/92 \pm 6/37$ سال بود. بیشترین تعداد بیماران ۱۷ نفر(۴۵/۹درصد) دارای گروه خونی A و کمترین تعداد آنها ۴ نفر(۱۰/۸درصد) گروه خونی AB داشتند. اکثریت واحدهای مورد پژوهش ۳۲ نفر(۵/۸۶درصد) دارای RH مثبت بودند. اکثریت بیماران ۱۱ نفر(۷/۲۹درصد) دارای تحصیلات ابتدایی و یک نفر (۷/۲درصد) از واحد پژوهش دارای مدرک دیپلم بود. میانگین سن تشخیص بیماری $18/11 \pm 20$ ماه بود. شروع تزریق خون در $8/5$ درصد(۳۲ نفر) زیر دو سال و فواصل تزریق خون ۲۱-۲۸ روز بود. اکثریت واحدهای مورد پژوهش ۵/۸۶درصد(۳۲ نفر) دسفرال دریافت نموده و از بین ۹۱/۹ درصد(۳۴ نفر) آنها دسفرال با پمپ تزریق می شد. ۱۲ نفر(۴/۳۲درصد) سابقه جراحی برداشت طحال با میانگین سنی $10/33 \pm 4/20$ داشتند. در بین واحدهای

مقدمه

بنا تالاسمی یکی از بیماری های شایع ژنتیکی در دنیا و به ویژه در مناطق مدیترانه می باشد (۱)، این بیماری یکی از مشکلات جامعه امروزی ما و بسیاری از کشورهای جهان بوده و شایع ترین بیماری ارثی در ایران است(۲-۳). تخمین زده شده که حدود ۹۵ درصد مبتلایان به این بیماری در آسیا، هند و خاورمیانه به دنیا می آیند که متوسط شیوع آن در این مناطق ۴ درصد گزارش شده است (۴-۵). در ایران بیش از دو میلیون ناقل بنا تالاسمی و بیش از پانزده هزار فرد مبتلا به بنا تالاسمی مازور زندگی می کنند (۶). بنا تالاسمی مازور از جمله بیماریهایی است که در آن رشد طبیعی افراد به خاطر عوارض ناشی از بیماری دچار اختلال می شود (۷). عقب ماندگی رشد در بیماران بنا تالاسمی به عوامل مختلفی بستگی دارد که می توان به کم خونی مژمن، کمبود اسید فولیک، پرکاری طحال، اختلالات غدد درون ریز، کمبود روحی و مسمومیت با داروی دسفرال اشاره کرد (۸). اغلب بیماران مبتلا به بنا تالاسمی در سالهای اول عمر رشد طبیعی دارند اما به دلایل مختلف از حوالی ۹-۱۰ سالگی دچار کاهش رشد شده و درصد قابل توجهی از آنها در نهایت کوتاه قد باقی می مانند (۹). تاخیر رشد در این بیماران در اوایل کودکی، ناشی از کم خونی شدید می باشد که می توان از این عارضه با تزریق مداوم خون پیشگیری نمود. این نکته را باید دانست که حتی در کودکانی که به خوبی تحت تزریق خون قرار می گیرند، جهش رشد در دوران نوجوانی و قبل از آن به تاخیر می افتد و حتی متوقف می شود، به طوریکه به ندرت افراد مبتلا دارای قد طبیعی هستند. اختلال رشد بیشتر به دلیل فعالیت کم سوماتومدین، تا پاسخ ضعیف هورمون رشد است. از آنجا که سوماتومدین توسط کبد ساخته می شود هموسیدروز کبدی مسئول اختلال رشد در قبل از بلوغ به حساب می آید (۱۰). در این بیماران تجمع آهن عامل اصلی اختلالات بوجود آمده در ارگانهای مختلف می باشد. در مبتلایان اختلالات رشد، کمبود هورمون رشد، نارسایی غدد جنسی و کم کاری تیروئید شایع تر است (۱۱). اختلال رشد و نمو یکی از عوارض جدی و شایع مبتلایان به تالاسمی می باشد و با توجه به اینکه در استان اردبیل مطالعه ای به این منظور صورت نگرفته است، لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان

بحث

علی رغم همه پیشرفت‌هایی که در درمان بیماران مبتلا به بتا تالاسمی مژوور صورت گرفته اختلال رشد همچنان از مشکلات مهم این بیماران به شمار می‌رود (۹). در مطالعه حاضر بیش از ۹۵ درصد بیماران میزان رشد کمتر از صدک ۵۰ درصد داشتند. در حالی که در جامعه نرمال باید ۴۵ درصد افراد بین صدک ۵۰-۹۵ قرار گیرند. مطالعه خلیلی و همکاران نیز نشان داد که بیش از ۹۰ درصد مبتلایان به بتا تالاسمی مژوور میزان رشد کمتر از صدک ۵۰ داشتند (۱۲). در مطالعه حاضر حدود ۶۴/۹ درصد مبتلایان قد کمتر از صدک ۵ درصد داشتند. نتایج حاصل از پژوهش نوری و بربری که در زاهدان انجام گرفته نشان داد که از ۱۵۷ دختر مبتلا ۴۷ نفر و از ۱۶۷ پسر مبتلا ۵۹ نفر قد زیر صدک ۵ درصد داشتند (۷). در مطالعات انجام شده در سراسر دنیا نیز کوتاهی قد از عوارض شایع در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی مژوور گزارش شده است (۱۳). مطالعه مانشان داد که اختلال رشد قدی مبتلایان با بالا رفتن سن افزایش پیدا می‌کند، بطوریکه از دهه دوم زندگی بر شدت آن افزوده می‌شود. در مطالعه شیوا و همکاران نیز بیش از ۵۰ درصد بیماران مورد مطالعه بالای ۱۰ سال قد کوتاه داشتند و فقط ۱۰ درصد بیماران کمتر از ۱۰ سال کوتاه قد بودند (۹). اگر چه تاخیر رشد در بیماران بتا تالاسمیک از دهه اول عمر شروع می‌شود، اما با درمانهای امروزی معمولاً از حوالی ۹-۱۰ سالگی سرعت رشد افت پیدا می‌کند و درصد قابل توجهی از این بیماران در نهایت کوتاه قد می‌شوند (۱۴). مطالعه حاضر نشان داد که ۵۴ درصد مبتلایان وزن کمتر از صدک ۵ درصد داشتند که با افزایش سن این اختلاف بیشتر می‌شد، مطالعه کمالی و همکاران نیز نشان داد که میانگین وزن دختران و پسران مبتلا به تالاسمی زیر معیار منحنی رشد استاندارد بود و با افزایش سن این اختلاف بیشتر می‌شد طوریکه در بین دختران در ۱۴ سالگی و در پسران در ۱۶-۱۷ سالگی به بیشترین میزان می‌رسید (۸). مطالعه نوری و بربری نیز تائید کننده این موضوع بود بطوریکه وزن همه بیماران زیر صدک سوم بود (۷). با توجه به کم بودن تعداد نمونه‌ها که جزء محدودیت‌های پژوهش می‌باشد نتایج بدست آمده فقط قابل تعمیم به مراجعه کنندگان کلینیک بوعلی اردبیل می‌باشد.

مورد پژوهش ۲۱ نفر (۵۶/۷ درصد) دچار تغییرات چهره (برنzech شدن پوست، برجستگی استخوان گونه و پیشانی، کشیدگی چشم‌ها به سمت بالا و پهن شدن پل بینی) شده بودند. آزمون آماری تی تست نشان داد که بین سن تشخیص بیماری با تغییرات چهره ای مبتلایان ارتباط آماری معنی داری وجود دارد ($P<0.005$). ۱۷ نفر (۴۵/۹ درصد) از مبتلایان دارای خواهر یا برادر مبتلا به بتا تالاسمی مژوور بودند. ۱۶ نفر (۴۳/۲ درصد) از مبتلایان دارای سابقه خانوادگی ابلا به بتا تالاسمی مژوور بودند. تحصیلات پدر در ۲۳ نفر (۶۲/۳ درصد) و تحصیلات مادر در ۲۹ نفر (۷۸/۳ درصد) بی سواد یا ابتدایی بود. شغل پدر در ۳۱ نفر (۸۳/۸ درصد) آزاد و مادران همه مبتلایان خانه دار بودند. میانگین قدی مبتلایان ۱۴۲/۴۳ \pm ۱۸/۰۳ سانتی متر و میانگین وزنی ۳۸/۴۱ \pm ۱۲/۳۲ کیلوگرم بود. توزیع رشد قدی و وزنی بر اساس منحنی رشد نلسون در جدول های شماره ۱ و ۲ آمده است. بدین ترتیب ۶۴/۹ درصد (۲۴ نفر) بیماران قد زیر صدک ۵ درصد و ۵۴ درصد (۲۰ نفر) آنان وزن زیر صدک ۵ درصد داشتند.

جدول ۱: توزیع رشد قدی بیماران تالاسمی مژوور

| درصد | فراوانی | صدک |
|------|---------|--------|
| ۶۴/۹ | ۲۴ | %>۵ |
| ۸/۱ | ۳ | %۵-۱۰ |
| ۱۶/۲ | ۶ | %۱۰-۲۵ |
| ۸/۱ | ۳ | %۲۵-۵۰ |
| ۲/۷ | ۱ | %۷۵-۹۰ |
| ۱۰۰ | ۳۷ | جمع |

جدول ۲ توزیع رشد وزنی بیماران تالاسمی مژوور

| درصد فراوانی | فراوانی | صدک |
|--------------|---------|--------|
| ۵۴ | ۲۰ | %>۵ |
| ۸/۱ | ۳ | %۵-۱۰ |
| ۲۷/۱ | ۱۰ | %۱۰-۲۵ |
| ۸/۱ | ۳ | %۲۵-۵۰ |
| ۲/۷ | ۱ | %۷۵-۹۰ |
| ۱۰۰ | ۳۷ | جمع |

نتیجه گیری

نتایج کلی حاصل از مطالعه ما بیانگر این است که بیماران مبتلا به بتا تالاسمی مژوور از همان دهه اول زندگی در خطر اختلال رشد هستند و با افزایش سن این اختلال شدت بیشتری می یابد. به همین خاطر لازم است از همان اوایل زندگی از نظر وضعیت رشد به طور مرتب کنترل شوند و عوامل دخیل در اختلال رشد آنها به موقع شناسایی و اقدامات پیشگیری کننده مناسب صورت گیرد.

تشکر و قدردانی

از همکاری کارکنان بخش تالاسمی بیمارستان بوعلی و بیماران بخش تشکر و قدردانی می شود.

References:

- 1- Karami H, Kowsaryan M, Vahidshahi K, Karami H, Shahmohammadi S, Mahdavi M, Hashemi MB, Yousefi ,Abdolmaleki A, Majdi M, Ahangar M. Assessment of demographic, clinical and laboratory status of patients with thalassemia major and intermedia referred to thalassemia research center in Sari, Iran, during 2007- 2009. *Pejouhandeh* 2010;15(4):186-92.[persian]
- 2- Kiani AA, Mortazavi Y, Zeinali S, Shirkhani Y. The Molecular Analysis of Beta-thalassemia Mutations in Lorestan Province, Iran. *Journal of Hemoglobin* 2007;31(3):343-9. [persian]
- 3- Najmabadi H, Karimi-Nejad R, Sahebjam S, Pourfarzad F, Teimourian S, Sahebjam F, Amirizadeh N, Karimi-Nejad MH. The beta-thalassemia mutation spectrum in the Iranian population. *Journal of Hemoglobin* 2001;25(3): 285-96. [persian]
- 4- Vichinsky EP, MacKlin EA, Waye JS, Lorey F, Olivieri NF. Changes in the epidemiology of thalassemia in North America: a new minoriyt disease. *Pediatrics* 2005; 116(6):e818-25.
- 5- Gomber S, Dewan P. Physical growth patterns and dental caries in thalassemia. *Indian Pediatr.* 2006;43(12):1064-9.
- 6- Derakhshandeh-Peykar P, Akhavan-Niaki H,Tamaddoni A, Ghawidel-Parsa S, Naieni KH,Rahmani M, Babrzadeh F, Dilmaghani-Zadeh M, Farhud DD. Distribution of beta-thalassemia mutations in the northern provinces of Iran. *Journal of Hemoglobin* 2007; 31(3):351-6.
- 7- Nori N,Berberi F.Growth abnormalities in thalassemia major patients over 10 years in Ali Asghar Hospital, Zahedan. *Urmia Medical Journal*.2002;13(3);191-8.[persian]
- 8- Kamali A,Bazrafkan F,Haji Seyed Abutorabi M.Height and weight of patients with thalassemia major and its comparison with the NCHS.The *Journal of Qazvin University of Medical Sciences*.2001;19:33-88.[persian]
- 9- Siamak SH,Sary Sorkhabi R.Short stature in patients with beta thalassemia major. *Urmia Medical Journal*.2008;19(2):125-131.[persian]
- 10- Greer JP, Foerster J, George M, Rodgers, Paraskevas F, Glader B, Daniel A. Arber T, Robert T. Means Jr. *Wintrob's clinical hematology*. 12th ed. Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins. 2009.
- 11- Weatherall BJ, Cleyg JB. *The thalassemia ayndromes*. 4th ed. Philadelphia, Blackwell Science, 2001; 302.
- 12- Khalili D,Boliki Moghadam K,Fahimfar N,Gharvi M. growth in thalassemia major patients in Rasht city. *Journal of Gilan University of Medical Sciences*.2007; 16(61):90-95. [persian]
- 13- Hamidah A, Rahmah R, Azmi T, Aziz J, Jamal R.Short statute and truncul shortening in transfusion dependent thalassemia patients: Results from a thalassemia center in Malaysia. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 2001; 32(3):625-30.
- 14- Low Louis CK. Growth of children with β thalassemia major. *Indian J Pediatr* 2005; 72(2): 159-64